

# Bekämpfungsrichtwerte für Schädlinge in Winterraps

Schädling	Kontrolltermin	Art der Kontrolle	Bekämpfungsrichtwert
Rapserrdfloh	Herbst	Blattfraß	> 10 %
		Gelbschalen	100 Käfer in 3 Wochen/Gelbschale
		Zählen der Larven	3 bis 5 Larven/ Pflanze im Herbst
Großer Rapsstängelrüssler Gefleckter Kohltriebrüssler Kohltriebrüssler	Februar bis April	Gelbschalen	10 bis 15 Käfer in 3 Tagen/ Gelbschale <sup>1)</sup>
Rapsglanzkäfer	Knospenbildung	Abklopfen der Knospen und Blüten	> 10 Käfer/Pflanze
Kohlschotenrüssler	Blüte	Zählen der Käfer und Mücken	1 Käfer/ 1-2 Pflanzen
Kohlschotenmücke			1 Mücke/4 Pflanzen <sup>2)</sup> 1 Mücke/Pflanze <sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> = Beim gefleckten Kohltriebrüssler Insektizid erst nach Reifungsfraß einsetzen (Hinweise des amtlichen Pflanzenschutz beachten)

<sup>2)</sup> bei starkem Auftreten des Kohlschotenrüsslers, <sup>3)</sup> bei geringem Auftreten des Kohlschotenrüsslers